



Deposited via The University of Sheffield.

White Rose Research Online URL for this paper:

<https://eprints.whiterose.ac.uk/id/eprint/232053/>

Version: Published Version

Article:

Pereira, M.P., Stevanovic, K., Kocatürk, E. et al. (2025) Internationale Umfrage zur Behandlungspraktiken bei atopischer Dermatitis bei schwangeren und stillenden Frauen: Perspektiven von Ärzten. JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, 23 (9). pp. 1116-1125. ISSN: 1610-0379

https://doi.org/10.1111/ddg.15728_g

Reuse

This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY) licence. This licence allows you to distribute, remix, tweak, and build upon the work, even commercially, as long as you credit the authors for the original work. More information and the full terms of the licence here:

<https://creativecommons.org/licenses/>

Takedown

If you consider content in White Rose Research Online to be in breach of UK law, please notify us by emailing eprints@whiterose.ac.uk including the URL of the record and the reason for the withdrawal request.

Internationale Umfrage zur Behandlungspraktiken bei atopischer Dermatitis bei schwangeren und stillenden Frauen: Perspektiven von Ärzten

International survey of treatment practices for atopic dermatitis in pregnant and breastfeeding women: Physician perspectives

Manuel P. Pereira^{1,2,3} | Katarina Stevanovic^{1,2,3} | Emek Kocatürk^{1,2,4} | Cathrin Meesch^{1,2,3} | Ingrid van Hofman³ | Prema S. Vaswani^{1,2} | Jonathan A. Bernstein⁵ | Dayanne Bruscky⁶ | Herberto J. Chong-Neto⁷ | Chia-Yu Chu⁸ | Roberta Fachini Jardim Criado⁹ | Luis Felipe Ensina¹⁰ | Ana M. Giménez-Arnau¹¹ | Kiran Godse¹² | Maia Gotua^{13,14} | Stamatios Gregoriou¹⁵ | Kanokvalai Kulthanan¹⁶ | Charlotte G. Mortz¹⁷ | Natasa Teovska Mitrevska¹⁸ | Esen Özkaya¹⁹ | Prajwal Pudasaini²⁰ | Mara Morelo Rocha Felix²¹ | Catalina Rincón Pérez²² | Claudio Alberto Salvador Parisi²³ | Gonzalo N. Ramón²⁴ | Efstratios Vakirlis²⁵ | Zuotao Zhao²⁶ | Lisa A. Beck²⁷ | Marjolein de Bruin-Weller²⁸ | Michael Cork²⁹ | Norito Katoh³⁰ | Thomas Werfel³¹ | Margitta Worm³²  | Andreas Wollenberg^{33,34,35} | Torsten Zuberbier^{1,2,3}

¹Institute of Allergology, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Corporate Member of Freie Universität Berlin and Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany

²Fraunhofer Institute for Translational Medicine and Pharmacology ITMP, Immunology and Allergology, Berlin, Germany

³GA2LEN, Global Allergy and Asthma Excellence Network, Berlin, Germany

⁴Bahcesehir University School of Medicine, Department of Dermatology, Istanbul, Turkey

⁵University of Cincinnati College of Medicine, Division of Rheumatology, Allergy and Immunology, Partner of Bernstein Allergy Group and Bernstein Clinical Research Center

⁶Allergy and Immunology Research Center, Federal University of Pernambuco, Recife, Brazil

⁷Division of Allergy and Immunology-Complexo Hospital de Clínicas-Federal University of Paraná, Brazil

⁸Department of Dermatology, National Taiwan University Hospital and National Taiwan University College of Medicine, Taipei, Taiwan

⁹Department of Dermatology, Centro Universitário FMABC, Alergias e Dermatologia – UCARE/ADCARE Center of Excellence – GA²LEN, Santo André, Brazil

¹⁰CPAAlpha Clinical Research and Allergy Center, Barueri, Brazil

¹¹Department of Dermatology, Hospital del Mar Research Institute, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain

¹²D Y Patil University school of medicine, Navi Mumbai, India

Manuel P. Pereira and Katarina Stevanovic gleichermaßen zu dieser Arbeit beigetragen.

This is an open access article under the terms of the [Creative Commons Attribution](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) License, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

© 2025 The Author(s). *Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft* published by John Wiley & Sons Ltd on behalf of Deutsche Dermatologische Gesellschaft.

- ¹³Center of Allergy and Immunology, ADCARE Center, Tbilisi, Georgia
- ¹⁴David Tvildiani Medical University, Tbilisi, Georgia
- ¹⁵1st Department of Dermatology and Venereology, Andreas Sygros Hospital, Faculty of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece
- ¹⁶Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Siriraj ADCARE Center, Bangkok, Thailand
- ¹⁷Department of Dermatology and Allergy Center, Odense University Hospital, Odense, Denmark
- ¹⁸Department of Dermatology, Remedika General Hospital, Skopje, North Macedonia
- ¹⁹Department of Dermatology and Venereology, İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul University, İstanbul, Turkey
- ²⁰Civil Service Hospital, ADCARE Center, Government of Nepal, Kathmandu, Nepal
- ²¹Alergolife ADCARE Center, Rio de Janeiro, Brazil
- ²²GA²LEN Atopic Dermatitis Center of Reference and Excellence, Medical Specialty Unit, Secretaría de la Defensa Nacional, Mexico City, Mexico
- ²³Pediatric and Adult Allergy Sections, Italian Hospital of Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
- ²⁴Instituto de Alergia e Inmunología del Sur, Bahía Blanca, Argentina
- ²⁵1st Department of Dermatology and Venereology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
- ²⁶Department of Dermatology and Venereology, Peking University First Hospital, Beijing Key Laboratory of Molecular Diagnosis on Dermatoses, National Clinical Research Center for Skin and Immune Diseases, NMPA Key Laboratory for Quality Control and Evaluation of Cosmetics, Beijing, China
- ²⁷University of Rochester Medical Center, Rochester, New York, USA
- ²⁸Department of Dermatology and Allergology, National Expertise Center for Atopic Dermatitis, University Medical Center Utrecht, Utrecht, The Netherlands
- ²⁹Sheffield Dermatology Research, IICD, University of Sheffield, Sheffield, UK
- ³⁰North Campus, Kyoto Prefectural University of Medicine, Kyoto, Japan
- ³¹Department of Dermatology and Allergy, Hannover Medical School, Hannover, Germany
- ³²Division of Allergy and Immunology, Department of Dermatology and Allergology, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany
- ³³Department of Dermatology and Allergy, Augsburg University Hospital, Augsburg, Germany
- ³⁴Department of Dermatology and Allergy, Ludwig Maximilian University of Munich, Munich, Germany
- ³⁵Comprehensive Center for Inflammatory Medicine (CCIM), University Hospital Schleswig-Holstein (UKSH), Lübeck, Germany

Korrespondenzanschrift

Manuel P. Pereira, MD, PhD, Institut für Allergologie, Charité – Universitätsmedizin Berlin, und Fraunhofer-Institut für Translationale Medizin und Pharmakologie ITMP, Campus Benjamin Franklin, Hindenburgdamm 30, 12203 Berlin.
Email: manuel.pereira@charite.de

Zusammenfassung

Hintergrund und Ziele: Die systemische Behandlung von schwangeren/stillenden Patientinnen mit atopischer Dermatitis (AD) ist aufgrund begrenzter Sicherheitsdaten eine Herausforderung. Wir untersuchten die Behandlungspraktiken mit systemischen Therapeutika, einschließlich des in den Leitlinien empfohlenen Ciclosporin als erste systemische Wahl, sowie neue Therapien in dieser vulnerablen Bevölkerungsgruppe.

Patienten und Methodik: Die ADCARE-Initiative des *Global Allergy and Asthma Excellence Network* (GA²LEN) sammelte weltweit Daten von Ärzten, die schwangere Frauen mit AD behandeln. Die Ärzte füllten einen elektronischen Fragebogen zur Anwendung systemischer Therapeutika bei schwangeren/stillenden AD-Patientinnen aus.

Ergebnisse: 103 Ärzte aus 32 Ländern, vor allem Dermatologen (n = 48) und Allergologen (n = 43), nahmen an der Studie teil. Antihistaminika waren das am häufigsten in Erwägung gezogene systemische Arzneimittel während der Schwangerschaft/Stillzeit (n = 73/81, 90,1%), wobei für das erste Trimester weniger Ärzte den Einsatz systemischer Wirkstoffe in Erwägung zogen als für spätere Phasen der Schwangerschaft. Bei akuten Schüben wurden systemische Kortikosteroide (n = 34/80, 42,5%) bevorzugt, gefolgt von Biologika und Antihistaminika (jeweils n = 15/80, 18,8%). Obwohl das in den Leitlinien empfohlene Ciclosporin gelegentlich für AD während der Schwangerschaft in Betracht gezogen wird (n = 38/81, 46,9%), wurde es von den Ärzten nur selten als bevorzugtes Medikament angesehen (n = 1/80, 1,25%).

Schlussfolgerungen: Unsere Studie zeigt eine Diskrepanz zwischen den Leitlinienempfehlungen und den Verschreibungspraktiken und weist auf einen unbe-

deckten Bedarf an Wissen und der Anwendung der bestehenden Empfehlungen hin.

SCHLÜSSELWÖRTER

Atopische Dermatitis, Schwangerschaft, Stillen, systemische Therapie, Umfrage

Summary

Background and Objectives: Systemic treatment of pregnant/breastfeeding atopic dermatitis (AD) patients is challenging due to limited safety data. We explored treatment practices with systemic agents, including the guideline-recommended cyclosporine as the first systemic choice as well as emerging therapies, in this vulnerable population.

Patients and Methods: The Global Allergy and Asthma Excellence Network (GA²LEN) ADCARE initiative collected data from physicians worldwide who treat pregnant women with AD. Physicians completed an electronic questionnaire on the use of systemic agents in pregnant/breastfeeding AD patients.

Results: 103 physicians from 32 countries completed the survey, primarily dermatologists (n = 48) or allergologists (n = 43). Antihistamines were the systemic drug most often considered to be used during pregnancy/breastfeeding (n = 73/81, 90.1%), with fewer physicians considering the use of systemic agents for the first trimester compared to later stages of pregnancy. For acute flares, systemic corticosteroids (n = 34/80, 42.5%) were preferred, followed by biologics and antihistamines (each n = 15/80, 18.8%). Although the guideline-recommended cyclosporine is sometimes considered for AD during pregnancy (n = 38/81, 46.9%), it was rarely considered as the preferred drug by physicians (n = 1/80, 1.25%).

Conclusions: Our study shows a misalignment between guideline recommendations and prescription patterns and highlights an unmet need for knowing and using the existing recommendations.

KEYWORDS

Atopic dermatitis, breastfeeding, pregnancy, survey, systemic treatment

EINLEITUNG

Die atopische Dermatitis ist eine chronisch-rezidivierende, stark juckende, entzündliche Hauterkrankung.^{1,2} Sie geht mit zahlreichen Komorbiditäten einher und beeinträchtigt die Lebensqualität der Patienten erheblich.³ Patienten leiden nicht nur unter dem sozialen Stigma einer sichtbaren Hauterkrankung, sondern auch unter starkem Pruritus, der zu Kratzläsionen und erheblichen Schlafstörungen führt. Der dadurch verursachte psychische Stress verstärkt wiederum Pruritus und Ekzem – ein Teufelskreis entsteht.^{1,4} Die Behandlung der atopischen Dermatitis erfordert einen multimodalen Ansatz, der verschiedene Maßnahmen umfasst: Stärkung der Hautbarriere, eine topische entzündungshemmende und juckreizlindernde Therapie, antibakterielle Strategien sowie systemische Therapien. Zu Letzteren zählen moderne Biologika wie Dupilumab, Tralokinumab und Lebrikizumab, Januskinase (JAK)-Inhibitoren wie Abrocitinib, Baricitinib und Upadacitinib sowie klassische Immunsuppressiva, darunter Ciclosporin, Methotrexat und Aza-

thioprin. Diese Therapien tragen zur Krankheitskontrolle und Vorbeugung von Komorbiditäten bei.^{1,5,6}

Die atopische Dermatitis ist die häufigste Hauterkrankung während der Schwangerschaft und macht bis zu 50% aller schwangerschaftsbedingten Dermatosen aus.^{7,8} Veränderungen des Hormonspiegels beeinflussen das Zytokin-Gleichgewicht und können zu einer erneuten Manifestation ekzematöser Läsionen führen, die als atopische Eruption in der Schwangerschaft bezeichnet werden.⁷ Bei etwa 50% der AD-Patientinnen verschlimmert sich eine bereits vor der Schwangerschaft bestehende AD während der Schwangerschaft.⁹

Die Behandlungsmöglichkeiten für schwangere oder stillende AD-Patientinnen sind aufgrund teratogener Effekte oder fehlender Sicherheitsdaten aus Schwangerschaftskohorten begrenzt.¹⁰ Aus Umfragen im Vereinigten Königreich geht außerdem hervor, dass über 70% der schwangeren AD-Patientinnen die Einnahme von Medikamenten bewusst ablehnen, weil sie befürchten, dem Fötus zu schaden.¹¹ Bei diesen Patientinnen wird von einer

Behandlung mit Antihistaminika berichtet, obwohl der AD-induzierte Pruritus Histamin-unabhängig ist und Antihistaminika die Entzündung nicht wesentlich beeinflussen.⁷ Demgegenüber empfehlen sowohl die *European Task Force on Atopic Dermatitis* (ETFAD) als auch die aktuellen europäischen Leitlinien für atopische Dermatitis (EuroGuiDerm-Leitlinie) Ciclosporin als Erstlinientherapie während der Schwangerschaft oder Stillzeit in schweren Fällen.^{5,6,10} Angesichts neu auftretender Therapien wurde jedoch ein Dokument mit dem Titel „Safety of dermatologic medications in pregnancy and lactation“ (Sicherheit von dermatologischen Medikamenten in Schwangerschaft und Stillzeit) erstellt, das in regelmäßigen Abständen aktualisiert wird, um die Sicherheitsprofile neuartiger Therapeutika für schwangere und stillende Frauen zu überprüfen.¹² Darüber hinaus werden derzeit Register geführt, in denen schwangere Patientinnen mit atopischer Dermatitis erfasst werden, die mit Dupilumab, Tralokinumab, Abrocitinib oder Ruxolitinib-Creme behandelt werden (siehe FDA Pregnancy Exposure Registries). Daten zu Behandlungsmerkmalen und Schwangerschaftsverläufen bei Frauen mit AD wurden in Dänemark und in den Vereinigten Staaten erhoben,^{13,14} während neuere bevölkerungsbasierte Studien den Verlauf der Schwangerschaft bei AD-Patientinnen untersuchten, ohne die durchgeführten Therapien zu analysieren.^{15,16} Es ist nach wie vor unklar, welche systemischen Behandlungen in klinischen Einrichtungen außerhalb Europas oder der USA bevorzugt werden. Ein Konsens über die systemische Therapie während der Schwangerschaft wurde bereits etabliert.¹⁷ Diese Studie zielt jedoch darauf ab, den ungedeckten Bedarf in der medizinischen Ausbildung zu erkennen, indem die Behandlungspraktiken von Ärzten, die routinemäßig AD-Patienten behandeln, auf internationaler Ebene untersucht werden.

Das ADCARE-Netzwerk umfasst spezialisierte Zentren zur Behandlung der atopischen Dermatitis und ist dem *Global Allergy and Asthma Excellence Network* (GA²LEN) angeschlossen – dem größten multidisziplinären Netzwerk für Forschung und klinische Versorgung im Bereich Allergie und Asthma. GA²LEN fördert internationale Forschungs- und Bildungsaktivitäten auf diesem Gebiet.

Diese Umfrage untersuchte die systemische Behandlungsstrategien von Ärzten, die schwangere oder stillende Frauen mit AD behandeln, und ob diese Ansätze mit den lokalen Behandlungsrichtlinien und den neuesten Erkenntnissen zur Sicherheit übereinstimmen.^{5,6,18–22} Die Ergebnisse sollen einen Impuls für die Entwicklung eines globalen Konsenses zu optimalen Behandlungsansätzen der atopischen Dermatitis bei schwangeren und stillenden Patientinnen geben.

PATIENTEN UND METHODIK

Studiendesign

Ärzte im ADCARE-Netzwerk, die regelmäßig AD-Patienten behandeln, wurden eingeladen, an einer Umfrage in englischer Sprache zu systemischer Behandlung von AD während der Schwangerschaft oder Stillzeit teilzunehmen; der verwendete Fragebogen ist in Abbildung S1 im Online-Supplement dargestellt. Die Ärztinnen und Ärzte wurden über Zielsetzung und Ablauf der Studie informiert. Ihre Teilnahme erfolgte auf freiwilliger Basis. Es ergaben sich keine Risiken oder Nachteile für die teilnehmenden Ärzte, einschließlich der Möglichkeit einer Verweigerung der Teilnahme. Die teilnehmenden Ärzte konnten jederzeit und ohne Angabe von Gründen aus dem Projekt aussteigen. Den teilnehmenden Ärzten wurde die Möglichkeit angeboten, auch Ärzte, die nicht zum ADCARE-Netzwerk gehören, zur Teilnahme an der Umfrage einzuladen. Da an dieser Studie keine Patienten beteiligt waren, wurde auf eine Genehmigung durch die Ethikkommission verzichtet.

Studienoutcomes

Der Fragebogen umfasste sechs Fragen, von denen in diesem Artikel die Ergebnisse zu fünf berichtet werden: (1) medizinische Fachrichtung der teilnehmenden Ärzte; (2) Anzahl schwangerer Patientinnen mit atopischer Dermatitis, die in den vergangenen 3 Jahren behandelt wurden; (3) systemische Behandlungsoptionen, die in jedem Trimester der Schwangerschaft oder während der Stillzeit in Betracht gezogen werden (einschließlich systemischer Kortikosteroide zur akuten beziehungsweise Langzeitanwendung; systemischer Immunsuppressiva wie Azathioprin, Ciclosporin, Methotrexat, Mycophenolatmofetil oder andere; Biologika wie Dupilumab, Tralokinumab oder andere; Januskinase (JAK)-Inhibitoren wie Abrocitinib, Baricitinib, Upadacitinib oder andere; sedierende und nichtsedierende Antihistaminika sowie weitere Arzneimittel); (4) bevorzugte systemische Therapie; (5) Komplikationen im Zusammenhang mit dem Schwangerschaftsverlauf (zum Beispiel Frühgeburt, vorzeitige Entbindung, Fehlbildungen, fetaler Verlust oder andere).

Topische Therapien und Phototherapie wurden im Rahmen dieser Erhebung nicht berücksichtigt.

Datenerfassung und -analyse

Die Daten wurden anonymisiert in einer zentralen Datenbank vom 10. Juni 2023 bis zum 23. November 2023 erfasst.




ABBILDUNG 1 Anzahl der in den letzten drei Jahren behandelten schwangeren Patientinnen mit atopischer Dermatitis. X-Achse: Anzahl der Befragten.

Fehlende Daten wurden mittels vollständiger Fallanalyse behandelt. Statistische Analysen wurden mit *IBM SPSS Statistics for Windows, Version 27* (Armonk, NY, USA), durchgeführt. Die Daten werden als Anzahl der Fälle/Gesamtzahl der Bewertungen (Prozentsatz der Fälle) angegeben.

ERGEBNISSE

Teilnehmer

Insgesamt nahmen 103 Ärzte aus 32 Ländern auf sechs Kontinenten an der Umfrage teil. Die meisten Befragten kamen aus Asien ($n = 54$) und Europa ($n = 28$), wobei Thailand das am stärksten vertretene Land war ($n = 25$), gefolgt von Indien ($n = 8$), Brasilien ($n = 8$), Portugal ($n = 7$) und Deutschland ($n = 7$). Die meisten Ärzte waren entweder Dermatologen ($n = 48$) oder Allergologen ($n = 43$), mit einer breiten Verteilung hinsichtlich der Anzahl der in den letzten drei Jahren behandelten schwangeren AD-Patientinnen (Abbildung 1). Ein Teil der Befragten ($n = 81$) füllte den Fragebogen vollständig aus. Die Verteilung dieser Teilnehmer nach Kontinent, Land, Fachrichtung und Erfahrung in der Behandlung schwangerer Patientinnen mit AD ist in Tabelle 1 dargestellt.

Systemische Therapie

Antihistaminika wurden im Allgemeinen als Therapieoption während der gesamten Schwangerschaft und Stillzeit betrachtet ($n = 73/81$, 90,1%), allerdings hielt eine geringere Anzahl der Befragten sie für das erste Schwangerschaftstrimester für geeignet (Abbildung 2). Meistens wurden nichtsedierende Antihistaminika ($n = 56$) bevorzugt, während sedierende ($n = 19$) Antihistaminika seltener gewählt wurden.

Auch der kurzfristige Einsatz von systemischen Kortikosteroiden bei akuten Schüben wurde von den meisten Ärzten ($n = 58/81$, 71,6%) für durchführbar gehalten, allerdings zogen nur 25 Ärzte deren Einsatz im ersten Trimester in Betracht (Abbildung 2).

Obwohl Biologika nicht für den Einsatz in der Schwangerschaft oder Stillzeit zugelassen sind, waren sie für eine bedeutende Anzahl von Ärzten ($n = 38/80$, 47,5%) eine mögliche Therapieoption, wobei Dupilumab ($n = 42$) das Biologikum der Wahl war, gefolgt von Tralokinumab ($n = 9$) und anderen Biologika ($n = 2$). Auch hier stuften weniger Ärzte Biologika als Behandlungsoption für das erste Trimester, als für spätere Trimester oder während der Stillzeit ein.

Eine Minderheit der Befragten betrachtete systemische Immunsuppressiva als eine Therapieoption während der Schwangerschaft oder Stillzeit ($n = 19/81$, 23,5%). Ciclosporin ($n = 38$) wurde am häufigsten in Betracht gezogen, gefolgt von Azathioprin ($n = 11$). Bemerkenswert ist, dass auch Immunsuppressiva oder Immunmodulatoren mit bekannter teratogener Wirkung von einigen Befragten genannt wurden: Methotrexat ($n = 5$), JAK-Inhibitoren ($n = 4$) und Mycophenolatmofetil ($n = 3$).

Die langfristige Einnahme von Kortikosteroiden zur Behandlung von AD während der Schwangerschaft oder Stillzeit wurde nur selten in Betracht gezogen ($n = 3/81$, 3,7%), während $n = 27/80$ (33,8%) keine systemischen Mittel während der Schwangerschaft oder Stillzeit anwenden.

Bevorzugte systemische Therapien

Achtzig Ärzte beantworteten die Frage nach ihrer bevorzugten systemischen Behandlung von AD während der Schwangerschaft oder Stillzeit (Abbildung 3). Systemische Kortikosteroide bei akuten Schüben waren die häufigste Antwort ($n = 34$, 42,5%), gefolgt von Biologika ($n = 15$, 18,8%) und Antihistaminika ($n = 15$, 18,8%). Ciclosporin und Baricitinib wurden jeweils nur von einem Befragten als systemisches Arzneimittel der Wahl angegeben.

Dupilumab wurde am häufigsten als Biologikum der Wahl genannt ($n = 13$), während Tralokinumab von einem Befragten erwähnt wurde ($n = 1$) und bei einem Befragten die Daten fehlten ($n = 1$). Nichtsedierende Antihistaminika ($n = 8$) wurden im Vergleich zu sedierenden Antihistaminika ($n = 3$) häufiger als Antihistaminikum der Wahl angegeben.

Elf (13,8%) der Befragten gaben an, dass sie es bevorzugten, während der Schwangerschaft oder Stillzeit keine systemischen Mittel zur Behandlung von AD einzusetzen.

Komplikationen

Nur sechs Befragte gaben an, im Zusammenhang mit der Anwendung systemischer Therapien Komplikationen beim Schwangerschaftsverlauf erlebt zu haben. Zwei Ärzte berichteten von Frühgeburten und vorzeitigen Entbindungen. Fehlbildungen, fetaler Verlust sowie andere nicht weiter spezifizierte Komplikationen wurden jeweils einmal gemeldet.

TABELLE 1 Verteilung der Teilnehmer nach Kontinent, Land, Fachgebiet und Erfahrung in der Behandlung schwangerer Patientinnen mit atopischer Dermatitis. Die Daten der Befragten, die den gesamten Fragebogen ausgefüllt haben, sind dargestellt.

Kontinent	Anzahl der Befragten	Land	Fachgebiet	Behandelte Patientinnen in den letzten 3 Jahren
Asien	n = 39	Thailand: n = 17, Indien: n = 5, Vietnam: n = 4, Nepal: n = 3, China: n = 2, Israel: n = 2, Japan: n = 1, Malaysia: n = 1, Philippinen: n = 1, Taiwan: n = 1, Türkei*: n = 1, Vereinigte Arabische Emirate: n = 1	Dermatologie: n = 17 Allergologie: n = 15 Innere Medizin: n = 1 Allgemeinmedizin: n = 6	> 20: n = 5 11–20: n = 8 6–10: n = 3 3–5: n = 6 1–2: n = 9 Keine: n = 8
Europa	n = 24	Portugal: n = 6, Deutschland: n = 5, Griechenland: n = 2, Italien: n = 2, Russland: n = 2, Türkei*: n = 2, Österreich: n = 1, Dänemark: n = 1, Mazedonien: n = 1, Spanien: n = 1, Schweiz: n = 1	Dermatologie: n = 15 Allergologie: n = 9	> 20: n = 6 11–20: n = 4 6–10: n = 6 3–5: n = 5 1–2: n = 2 Keine: n = 1
Südamerika	n = 10	Brasilien: n = 8, Argentinien: n = 2	Dermatologie: n = 1 Allergologie: n = 9	> 20: n = 0 11–20: n = 0 6–10: n = 0 3–5: n = 3 1–2: n = 4 Keine: n = 3
Nordamerika	n = 5	Vereinigte Staaten von Amerika: n = 3, Kanada: n = 1, Mexiko: n = 1	Dermatologie: n = 4 Allergologie: n = 1	> 20: n = 1 11–20: n = 0 6–10: n = 2 3–5: n = 1 1–2: n = 1 Keine: n = 0
Afrika	n = 2	Madagaskar: n = 1, Südafrika: n = 1	Dermatologie: n = 1 Allergologie: n = 1	> 20: n = 0 11–20: n = 0 6–10: n = 2 3–5: n = 0 1–2: n = 0 Keine: n = 0
Australien	n = 1	Australien: n = 1	Dermatologie: n = 1	> 20: n = 1 11–20: n = 0 6–10: n = 0 3–5: n = 0 1–2: n = 0 Keine: n = 0

*Die Türkei wird nach Einschätzung der Befragten entweder zu Asien oder Europa gezählt.

DISKUSSION

Die Behandlung von AD-Patientinnen während der Schwangerschaft und Stillzeit ist nach wie vor eine Herausforderung, insbesondere wenn systemische Medikamente erforderlich sind. Unsere internationale Studie zeigte weltweite Behandlungstrends durch Ärzte auf. In erster Linie wurde festgestellt, dass einige Ärzte bei der Verabreichung von systemischen Medikamenten im ersten Trimester zurückhaltend sind, da die fetale Entwicklung in dieser Phase der Schwangerschaft besonders kritisch ist. Nichtsedierende Antihistaminika sind das Medikament, das von Ärzten am häufigsten als sicher für die Verwendung während der Schwangerschaft oder Stillzeit angesehen wird, und ihre verbreitete Anwendung spiegelt die überwältigenden Sicherheitsdaten wider, die für diese Medikamentenklasse vorliegen.²³ Antihistaminika der älteren Generation haben jedoch eine unbekannt

Wirkung auf den Fötus und sollten nicht verordnet werden.²⁴ Darüber hinaus zeigen Antihistaminika nur eine geringe entzündungshemmende und Pruritus-stillende Wirkung, da nichthistaminerge Nervenfasern für die Weiterleitung des atopischen Pruritus verantwortlich sind,^{25–27} so dass ihr Nutzen in der Behandlung der AD sowohl als Monotherapie als auch als Zusatztherapie begrenzt ist.²⁸ Dementsprechend werden Antihistaminika von der ETFAD- und EuroGuiDerm-Leitliniengruppen nicht zur Behandlung der AD empfohlen.^{5,6,17}

Der Einsatz von systemischen Kortikosteroiden zur Behandlung akuter Schübe wird von den meisten Ärzten befürwortet. Es gibt jedoch Bedenken hinsichtlich einer Unterdrückung der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse bei Neugeborenen, die durch langfristige Kortikosteroideinnahme verursacht werden kann.^{17,29}

Biologika, insbesondere Dupilumab, scheinen ebenfalls große Akzeptanz zu finden, wobei ihr Einsatz in späte-




ABBILDUNG 3 Bevorzugte systemische Behandlung der atopischen Dermatitis während der Schwangerschaft/Stillzeit. Dargestellt ist die Anzahl der Ärzte, die den Einsatz von systemischen Kortikosteroiden bei akuten Schüben, Biologika, Antihistaminika, Januskinase (JAK)-Inhibitoren, systemischen Immunsuppressiva und anderen systemischen Therapien zur Behandlung von atopischer Dermatitis während der Schwangerschaft und Stillzeit bevorzugen. X-Achse: Anzahl der Befragten.

ren Phasen der Schwangerschaft bevorzugt wird, um so kritische Phasen der fetalen Entwicklung zu vermeiden. Eine retrospektive Analyse der Exposition vor oder während der ersten 6 Wochen der Schwangerschaft bei Frauen mit AD ergab jedoch, dass während des ersten Trimesters kein signifikantes arzneimittelassoziiertes Risiko bestand.³⁰ Bei der Behandlung anderer Indikationen wie Asthma ist es üblich, Biologika bei Patientinnen weiterzuführen, die vor der Schwangerschaft bereits darauf angesprochen

ABBILDUNG 2 Systemische Therapien während der Schwangerschaft/Stillzeit. Dargestellt ist die Anzahl der Ärzte, die den Einsatz von Antihistaminika, systemischen Kortikosteroiden bei akuten Schüben, Biologika, systemischen Immunsuppressiva (einschließlich Ciclosporin), Januskinase (JAK)-Inhibitoren und systemischen Kortikosteroiden als Langzeitbehandlung zur Behandlung von AD während der Schwangerschaft und Stillzeit in Erwägung ziehen. X-Achse: Anzahl der Befragten.

haben.³¹ Wichtig ist, dass Biologika zur Behandlung von AD die Th2-Entzündung blockieren, die jedoch für den Erhalt der Schwangerschaft förderlich ist. Dadurch könnten sie eine Verschiebung hin zu einer Th1-Entzündung begünstigen. Da Th1-Zytokine mit Komplikationen wie Präeklampsie oder Frühgeburten in Verbindung gebracht werden und dem Fötus schaden könnten, sollte bei der Wahl einer Therapie, die die Th2-Entzündung hemmt, Vorsicht geboten sein. Dennoch deuten die derzeit verfügbaren Daten nicht darauf hin, dass Th2-blockierende Biologika die fetalen oder mütterlichen Outcomes beeinflussen, allerdings sind qualitativ hochwertige kontrollierte Studien erforderlich, um aussagekräftigere Ergebnisse zu erhalten.^{32–34} Ein höherer Anteil von Ärzten in Europa neigt dazu, Biologika einzusetzen, verglichen mit Asien. Dies deutet auf potenziell unterschiedliche Einstellungen zur systemischen Therapie während Schwangerschaft und Stillzeit in verschiedenen Kulturen hin. Zudem könnten unterschiedliche Zugangsbedingungen zu modernen systemischen Therapien und abweichende Erstattungsrichtlinien der Krankenkassen in den jeweiligen Regionen eine Rolle spielen.

Andererseits werden die meisten systemische Immunsuppressiva und JAK-Inhibitoren von den meisten Ärzten, die diesen Fragebogen beantwortet haben, nicht bevorzugt, da einige dieser Substanzen immer noch als sehr bedenklich im Hinblick auf potenzielle Risiken für die Mutter und den Fötus angesehen werden. Wichtig ist, dass

Methotrexat,³⁵ Mycophenolatmofetil,³⁶ JAK-Inhibitoren,³⁷ teratogen sind und in der Schwangerschaft kontraindiziert sind, wie auch in den amerikanischen AD-Leitlinien beschrieben.¹⁹ Für Ciclosporin hingegen gibt es solide Belege für seine Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit,^{38,39} und es wird sowohl von der ETFAD als auch von den aktuellen europäischen Leitlinien für AD empfohlen.^{5,6,17} Ein Expertengremium aus Kanada veröffentlichte im Jahr 2023 evidenzbasierte Empfehlungen zur systemischen Behandlung von AD, in denen Ciclosporin als die am besten belegte Option für schwangere oder stillende Frauen, die eine systemische Therapie benötigen, angesehen wird, während Methotrexat, Mycophenolatmofetil und JAK-Inhibitoren kontraindiziert sind.^{19,40} Ciclosporin wird zudem zur Behandlung anderer Indikationen wie Nierentransplantation und chronisch-entzündliche Darmerkrankungen während der Schwangerschaft eingesetzt.^{41–43}

Bemerkenswert ist, dass ein erheblicher Anteil der befragten Ärzte angab, während der Schwangerschaft oder Stillzeit keine systemischen Medikamente zur Behandlung von AD zu verwenden. Dies unterstreicht die Herausforderung, vor der Ärzte stehen, wenn sie AD bei schwangeren Patientinnen behandeln und gleichzeitig potenzielle Risiken für Mutter und Kind berücksichtigen müssen.

Zudem wurden von einzelnen Ärzten Komplikationen wie Frühgeburtlichkeit, kongenitale Fehlbildungen und fetaler Verlust berichtet. Bei unserem Studiendesign konnte keine der gemeldeten Komplikationen auf ein bestimmtes systemisches Medikament zurückgeführt werden, so dass diese Ergebnisse mit Vorsicht zu betrachten sind. Zu den weiteren Einschränkungen der Studie zählen die relativ geringe Teilnehmerzahl sowie die begrenzte globale Abdeckung, da insbesondere nur wenige Daten aus Australien (n = 1), Afrika (n = 2) und Nordamerika (n = 5) vorliegen, wie in Tabelle 1 dargestellt.

Unsere Studie zeigt somit, dass die aktuellen Empfehlungen zur systemischen Therapie der AD während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht immer von den behandelnden Ärzten befolgt werden. Die in unserer Umfrage beobachteten Diskrepanzen lassen sich wahrscheinlich auf unterschiedliche Erfahrungsniveaus der Befragten sowie auf regionale Unterschiede in der Behandlung schwangerer und stillender Patientinnen zurückführen. Zudem könnten sowohl Ärzte als auch Patientinnen besorgt über Nebenwirkungen und Komplikationen sein, wie beispielsweise Nierenversagen infolge einer Therapie mit Ciclosporin. Daher sollten Peer-Education-Initiativen, wie die ADCARE-Schulungen,^{44,45} häufiger und umfassender durchgeführt werden, um eine bessere allgemeine Versorgung dieser vulnerablen Patientengruppe mit mittelschwerer bis schwerer AD zu gewährleisten. Eine Analyse nach solchen Schulungsveranstaltungen zeigte einen Anstieg der Testergebnisse um 43% im Vergleich zum Wissensstand vor der Veranstaltung.⁴⁴ Für eine effektive Orientierung sollten Leitlinien regionale Besonderheiten berücksichtigen, darunter den Zugang zu modernen Medikamenten

und die Erstattungspolitik der Krankenversicherungen. Wir haben bereits früher die Komplexität der AD und die Vorteile der Einbeziehung verschiedener Stakeholders in die Behandlung und die Patientenaufklärung erörtert,⁴⁶ und daher die integrierten Versorgungspfade (Integrated Care Pathways) für AD als weiteres nützliches Dokument für Patienten und Ärzte entwickelt.¹ Mit der aktuellen Studie konnte ADCARE Erkenntnisse über bestehende Wissenslücken bei Ärzten gewinnen und Themen identifizieren, die in zukünftigen Schulungsveranstaltungen verstärkt behandelt werden sollten.

Fazit

Unsere Studie zeigte eine Diskrepanz zwischen den Leitlinienempfehlungen und den Verschreibungspraktiken von systemischen Medikamenten zur Behandlung schwangerer und stillender Frauen mit AD. Bildungsprogramme, die sich auf die Aktualisierung der Behandlung besonderer Patientengruppen konzentrieren, sowie langfristige Register zur Erfassung von Daten zur Anwendung systemischer Medikamente während der Schwangerschaft und Stillzeit, einschließlich Wirksamkeit und Sicherheit, sind erforderlich, um zukünftige Leitlinien sowie behandelnde Ärzte fundiert zu informieren.

FINANZIERUNG

Diese Studie wurde von Almirall finanziert. Der Sponsor unterstützte die Studie finanziell, hatte aber keinen Einfluss auf die Gestaltung des Studienprotokolls, die Datenerfassung, -analyse und -interpretation sowie auf die Entscheidung zur Veröffentlichung dieses Manuskripts. Die Autoren behielten die volle Kontrolle über alle Aspekte der Studie und die Erstellung des Manuskripts.

DANKSAGUNG

Open access Veröffentlichung ermöglicht und organisiert durch Projekt DEAL.

INTERESSENKONFLIKT

M.P.P. erhielt Forschungsgelder von Almirall; ist Prüfartz für Allakos, Celldex Therapeutics, Incyte, Sanofi und Trevi Therapeutics; und erhielt Beratungsvergütungen, Vortragshonorare und/oder Reisekostenerstattungen von AbbVie, Beiersdorf, Celltrion, Eli Lilly, GA²LEN, Galderma, Menlo Therapeutics, Novartis, P.G. Unna Academy, Sanofi, StreamedUP und Trevi Therapeutics. E.K. war als Referent und Berater für Novartis, Menarini und Pfizer tätig. M.D.B. war als Berater, Mitglied von Advisory Boards und/oder Referent für AbbVie, Almirall, Amgen, Aslan, Eli Lilly, Galderma, Leo Pharma, Pfizer, Regeneron und Sanofi-Genzyme tätig. N.K. erhielt Honorare als Referent/Berater für Sanofi, Maruho, AbbVie, Eli Lilly Japan, Taiho Pharmaceutical, Pfizer, Mitsubishi Tanabe Pharma, Janssen Pharma, Kyowa Kirin, Celgene Japan und Otsuka Pharmaceutical sowie forschungsmittelierte Drittmittel von Mitsubishi Tanabe Pharma, Torii Phar-

maceutical, Maruho, Sun Pharma, Boehringer Ingelheim Japan, Eisai und Leo Pharma. M.W. erhielt Unterstützung für Beratertätigkeiten, Vorträge und andere wissenschaftliche Aktivitäten von ALK-Abelló Arzneimittel GmbH, Almirall, AbbVie, Eli Lilly, Mylan Germany GmbH, Bencard Allergie GmbH, Novartis AG, Biotest AG, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, HAL Allergie GmbH, DBV Technologies S.A., Aimmune Therapeutics UK Limited, Regeneron Pharmaceuticals Inc. und Stallergenes GmbH. T.W. erhielt institutionelle Forschungsgelder von Almirall, Beiersdorf, LEO Pharma und Novartis; führte Beratungen für AbbVie, Almirall, Galderma, LEO, Lilly, Novartis, Pfizer und Sanofi-Regeneron durch; hielt Vorträge bei Fortbildungsveranstaltungen, die von AbbVie, Almirall, Galderma, LEO Pharma, Lilly, Pfizer, Sanofi und Novartis unterstützt wurden; und ist an klinischen Studien beteiligt, die mit verschiedenen Pharmaunternehmen zur Entwicklung von Therapien für atopische Dermatitis durchgeführt werden. A.W. war als Berater oder bezahlter Referent tätig oder nahm an klinischen Studien teil (mit Honoraren an die Institution) im Auftrag von AbbVie, Aileens, Almirall, Amgen, Beiersdorf, Bioderma, Bioproject, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Celgene, Chugai, DKSH, Eli Lilly, Galapagos, Galderma, Glenmark, GSK, Hans Karrer, Hexal, Janssen-Cilag, Kyowa Kirin, Leo Pharma, L'Oréal, Maruho, MedImmune, MSD, Mylan, Novartis, Pfizer, Pierre Fabre, Regeneron, Sandoz, Santen, Sanofi-Aventis und UCB. T.Z. erhielt Vortragshonorare von Amgen, AstraZeneca, AbbVie, ALK-Abelló, Almirall, Astellas, Bayer HealthCare, Bencard, Berlin Chemie, FAES Farma, HAL Allergie GmbH, Henkel, Kryolan, Leti, L'Oréal, Meda, Menarini, Merck Sharp & Dohme, Novartis, Nuocor, Pfizer, Sanofi, Stallergenes, Takeda, Teva, UCB und Uriach. Beratungsvergütungen aus der Industrie wurden von Abivax, Almirall, Blueprint, Celldex, Celltrion, Novartis und Sanofi erhalten. Darüber hinaus bestehen unbezahlte organisatorische Tätigkeiten: Mitglied im Komitee „Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma“ (ARIA); Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie (DGAKI); Leiter der European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF); Präsident des Global Allergy and Asthma Excellence Network (GA²LEN); sowie Mitglied des Komitees für Allergiediagnostik und molekulare Allergologie der World Allergy Organization (WAO). C.Y.C. erhielt Forschungsgelder von Sanofi; ist Prüfartz für AbbVie, Amgen, Dermira, Janssen, Eli Lilly, Novartis, Oneness Biotech, Pfizer, Regeneron Pharmaceuticals Inc., Roche und Sanofi; und erhielt Beratungsvergütungen, Vortragshonorare und/oder Reisekostenerstattungen von AbbVie, Amgen, Eli Lilly, Janssen, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi und Viatrix. A.G.A. ist oder war kürzlich als Referent und/oder Berater tätig und/oder erhielt Forschungsgelder von Almirall, Amgen, AstraZeneca, Avène, Blueprint, Celldex, Escient Pharmaceuticals, Genentech, GSK, Harmonic Bio, Instituto Carlos III-FEDER, Jaspers, Leo Pharma, Menarini, Mitsubishi Tanabe Pharma, Novartis, Sanofi-Regeneron, Septerna, Servier, Thermo Fisher Scientific, Uriach Pharma und Noucor. L.F.E. erhielt Beratungsvergütungen von Sanofi, Vortrags-

honorare von Sanofi, Novartis und AbbVie und nimmt an klinischen Studien von Novartis und Amgen teil. K.K. erhielt Vortragshonorare von Pfizer, Zuellig Pharma und Sanofi. E.Ö. war in beratender Funktion für Pfizer und Sanofi tätig und erhielt Vortragshonorare von beiden Unternehmen. C.R.P. ist Prüfartz für AbbVie und erhielt Beratungsvergütungen, Vortragshonorare und/oder Reisekostenerstattungen von AbbVie, Eli Lilly, Leo Pharma und Janssen-Cilag. K.S., C.M., I.V.H., P.V., L.B., D.B., H.C., K.G., M.G., S.G., C.M., N.T.M., P.P., M.M.R.F., C.A.S.P., G.R. und E.V. erklären, dass keine Interessenkonflikte bestehen.

ORCID

Margitta Worm  <https://orcid.org/0000-0002-3449-1245>

LITERATUR

- Zuberbier T, Abdul Latiff A, Aggelidis X, et al. A concept for integrated care pathways for atopic dermatitis-A GA(2)LEN ADCARE initiative. *Clin Transl Allergy*. 2023;13:e12299.
- Stander S. Atopic Dermatitis. *N Engl J Med*. 2021;384:1136-1143.
- Thyssen JP, Halling AS, Schmid-Grendelmeier P, et al. Comorbidities of atopic dermatitis-what does the evidence say? *J Allergy Clin Immunol*. 2023;151:1155-1162.
- Kapur S, Watson W, Carr S. Atopic dermatitis. *Allergy Asthma Clin Immunol*. 2018;14:52.
- Wollenberg A, Kinberger M, Arents B, et al. European guideline (Euro-GuiDerm) on atopic eczema: part I - systemic therapy. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2022;36:1409-1431.
- Wollenberg A, Kinberger M, Arents B, et al. European guideline (Euro-GuiDerm) on atopic eczema - part II: non-systemic treatments and treatment recommendations for special AE patient populations. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2022;36:1904-1926.
- Balakis G, Novak N. Atopic dermatitis and pregnancy. *J Allergy Clin Immunol*. 2022;149:1185-1194.
- Stefaniak AA, Pereira MP, Zeidler C, Ständer S. Pruritus in Pregnancy. *Am J Clin Dermatol*. 2022;23:231-246.
- Cho S, Kim HJ, Oh SH, et al. The influence of pregnancy and menstruation on the deterioration of atopic dermatitis symptoms. *Ann Dermatol*. 2010;22:180-185.
- Wollenberg A, Christen-Zach S, Taieb A, et al. ETFAD/EADV Eczema task force 2020 position paper on diagnosis and treatment of atopic dermatitis in adults and children. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2020;34:2717-2744.
- Twigg MJ, Lupattelli A, Nordeng H. Women's beliefs about medication use during their pregnancy: a UK perspective. *Int J Clin Pharm*. 2016;38:968-976.
- McMullan P, Yaghi M, Truong TM, et al. Safety of dermatologic medications in pregnancy and lactation: An Update - Part I: Pregnancy. *J Am Acad Dermatol*. 2024;91:619-648.
- Hamann CR, Egeberg A, Wollenberg A, et al. Pregnancy complications, treatment characteristics and birth outcomes in women with atopic dermatitis in Denmark. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2019;33:577-587.
- Dodge LE, Gao S, Sinnott S-J, et al. 700 - Characterization of atopic dermatitis medication use before and during pregnancy in the United States. *Br J Dermatol*. 2024;191:(Suppl 2).
- Isogami H, Murata T, Imaizumi K, et al. Association Between Atopic Dermatitis in Pregnant Women and Preterm Births: The Japan Environment and Children's Study. *Matern Child Health J*. 2024;28:1570-1577.
- Weng PC, Zhang JF, Kuo CF, Huang YH. Atopic dermatitis and the outcomes of pregnancy and offspring: A nationwide population-based study in Taiwan. *J Dtsch Dermatol Ges* 2025;23:54-63.
- Vestergaard C, Wollenberg A, Barbarot S, et al. European task force on atopic dermatitis position paper: treatment of parental atopic derma-

- titis during preconception, pregnancy and lactation period. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2019;33:1644-1659.
18. Rajagopalan M, De A, Godse K, et al. Guidelines on Management of Atopic Dermatitis in India: An Evidence-Based Review and an Expert Consensus. *Indian J Dermatol.* 2019;64:166-181.
 19. Panel AAJADG, Chu DK, Schneider L, et al. Atopic dermatitis (eczema) guidelines: 2023 American Academy of Allergy, Asthma and Immunology/American College of Allergy, Asthma and Immunology Joint Task Force on Practice Parameters GRADE- and Institute of Medicine-based recommendations. *Ann Allergy Asthma Immunol.* 2024;132:274-312.
 20. Smith S, Baker C, Gebauer K, et al. Atopic dermatitis in adults: An Australian management consensus. *Australas J Dermatol.* 2020;61:23-32.
 21. Kulthanan K, Tuchinda P, Nitiyaron R, et al. Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of atopic dermatitis. *Asian Pac J Allergy Immunol.* 2021;39:145-155.
 22. Rubel D, Thirumoorthy T, Soebaryo RW, et al. Consensus guidelines for the management of atopic dermatitis: an Asia-Pacific perspective. *J Dermatol.* 2013;40:160-171.
 23. Etwel F, Faught LH, Rieder MJ, Koren G. The Risk of Adverse Pregnancy Outcome After First Trimester Exposure to H1 Antihistamines: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Drug Saf.* 2017;40:121-132.
 24. So M, Bozzo P, Inoue M, Einarson A. Safety of antihistamines during pregnancy and lactation. *Can Fam Physician.* 2010;56:427-429.
 25. Yosipovitch G, Kim B, Luger T, et al. Similarities and differences in peripheral itch and pain pathways in atopic dermatitis. *J Allergy Clin Immunol.* 2024;153:904-912.
 26. Zeidler C, Pereira MP, Huet F, et al. Pruritus in Autoimmune and Inflammatory Dermatoses. *Front Immunol.* 2019;10:1303.
 27. Weisshaar E. [Antihistamines for treating pruritus: The end of an era?]. *Hautarzt.* 2020;71:525-527.
 28. Mattered U, Bohmer MM, Weisshaar E, et al. Oral H1 antihistamines as 'add-on' therapy to topical treatment for eczema. *Cochrane Database Syst Rev.* 2019;1:CD012167.
 29. Bandoli G, Palmsten K, Forbess Smith CJ, Chambers CD. A Review of Systemic Corticosteroid Use in Pregnancy and the Risk of Select Pregnancy and Birth Outcomes. *Rheum Dis Clin North Am.* 2017;43:489-502.
 30. Avallone G, Cavallo F, Tancredi A, et al. Association between maternal dupilumab exposure and pregnancy outcomes in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis: A nationwide retrospective cohort study. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2024;38:1799-1808.
 31. Chambers CD, Krishnan JA, Alba L, et al. The safety of asthma medications during pregnancy and lactation: Clinical management and research priorities. *J Allergy Clin Immunol.* 2021;147:2009-2020.
 32. Shakuntulla F, Chiarella SE. Safety of Biologics for Atopic Diseases During Pregnancy. *J Allergy Clin Immunol Pract.* 2022;10:3149-3155.
 33. Escola H, Figueras-Nart I, Bonfill-Orti M, et al. Dupilumab for atopic dermatitis during pregnancy and breastfeeding: Clinical experience in 13 patients. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2023;37:e1156-e1160.
 34. Akuffo-Addo E, Nicholas MN, Lansang P. Reported Pregnancy Outcomes in Women With Severe Atopic Dermatitis Treated With Dupilumab: A Systematic Review. *J Cutan Med Surg.* 2023;27:177-178.
 35. Verberne EA, de Haan E, van Tintelen JP, et al. Fetal methotrexate syndrome: A systematic review of case reports. *Reprod Toxicol.* 2019;87:125-139.
 36. Perez-Aytes A, Marin-Reina P, Boso V, et al. Mycophenolate mofetil embryopathy: A newly recognized teratogenic syndrome. *Eur J Med Genet.* 2017;60:16-21.
 37. Eichner A, Wohlrab J. Pharmacology of inhibitors of Janus kinases – Part 2: Pharmacodynamics. *J Dtsch Dermatol Ges.* 2022;20:1621-1631.
 38. Reggia R, Bazzani C, Andreoli L, et al. The Efficacy and Safety of Cyclosporin A in Pregnant Patients with Systemic Autoimmune Diseases. *Am J Reprod Immunol.* 2016;75:654-660.
 39. Grimer M, Caring for Australians with Renal I. The CARI guidelines. Calcineurin inhibitors in renal transplantation: pregnancy, lactation and calcineurin inhibitors. *Nephrology (Carlton).* 2007;12(Suppl 1):S98-S105.
 40. Adam DN, Gooderham MJ, Beecker JR, et al. Expert consensus on the systemic treatment of atopic dermatitis in special populations. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2023;37:1135-1148.
 41. Smolen JS, Landewe R, Breedveld FC, et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2013 update. *Ann Rheum Dis.* 2014;73:492-509.
 42. Leroy C, Rigot JM, Leroy M, et al. Immunosuppressive drugs and fertility. *Orphanet J Rare Dis.* 2015;10:136.
 43. Cao RH, Grimm MC. Pregnancy and medications in inflammatory bowel disease. *Obstet Med.* 2021;14:4-11.
 44. Hofman IV, Stevanovic K, Meesch C, et al. Ga²len adcare – responding to the need for ongoing education in atopic dermatitis for healthcare providers globally and currently in South Africa. *Current Allergy & Clinical Immunology.* 2022;35:78-81.
 45. Hofman Iv, Stevanovic K, Meesch C, et al. Ga²len adcare – responding to the need for ongoing education in atopic dermatitis for healthcare providers globally and currently in South Africa. *Curr Allergy Clin Immunol.* 2022;35:78-81.
 46. Zuberbier T, Beck LA, Bedbrook A, et al. Developing integrated care pathways for atopic dermatitis-Challenges and unmet needs. *Clin Transl Allergy.* 2023;13:e12236.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weitere unterstützende Informationen finden Sie online im Abschnitt „Supporting Information“ am Ende dieses Artikels.

How to cite this article: Pereira MP, Stevanovic K, Kocatürk E, et al. Internationale Umfrage zur Behandlungspraktiken bei atopischer Dermatitis bei schwangeren und stillenden Frauen: Perspektiven von Ärzten. *JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft.* 2025;23:1116–1125. https://doi.org/10.1111/ddg.15728_g